



NOMBRES COMPLEXES

Les notes suivantes s'adressent essentiellement aux futurs étudiants de première année de CPGE n'ayant pas suivi l'enseignement de maths expertes en terminale, mais pourront être lues avec profit par tous, y compris ceux qui sont déjà familiers des nombres complexes.

Les complexes feront de nouveau l'objet d'un chapitre en première année, mais puisqu'ils seront dès le début d'année utilisés dans d'autres disciplines (en physique notamment), mieux vaut avoir dès la rentrée une certaine aisance avec les calculs en complexes.

0.1 L'ENSEMBLE DES NOMBRES COMPLEXES

0.1.1 Définition, calculs sous forme algébrique

Les nombres réels¹ présentent une certaine disymétrie : les carrés sont toujours des nombres positifs.

En particulier, un réel strictement positif a possède toujours deux racines carrées², à savoir \sqrt{a} et $-\sqrt{a}$, alors qu'un réel strictement négatif ne possède aucune racine carrée.

Pour pallier à ceci, imaginons un nombre, que nous noterons i , tel que $i^2 = -1$.

Un tel nombre est purement imaginaire, et ne peut pas être un nombre réel : inutile de le chercher sur votre règle, ou de lui donner une signification géométrique quelconque, ce n'est ni une longueur, ni une aire.

À partir de ce nombre imaginaire i , il est possible de « créer » d'autres nombres, comme $i + i = 2i$, $-5i$, $\frac{i}{2}$ ou encore $1 - 2i$.

La définition précise de l'ensemble \mathbf{C} des nombres complexes est hors-programme en sup, et nous nous contenterons d'admettre qu'il existe un ensemble noté \mathbf{C} , dont tous les éléments s'écrivent de manière unique sous la forme $a + ib$, $(a, b) \in \mathbf{R}^2$, sur lequel sont définies deux opérations $+$ et \times , satisfaisant aux mêmes règles de calcul que dans \mathbf{R} et vérifiant $i^2 = -1$.

Ainsi, si $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ sont deux éléments de \mathbf{C} , on a

$$\blacktriangleright z + z' = (a + a') + i(b + b')$$

$$\blacktriangleright z \times z' = (a + ib)(a' + ib') = aa' + i(ab' + a'b) + \underbrace{i^2}_{=-1} bb' = (aa' - bb') + i(ab' + a'b).$$

Il est également possible de diviser par un nombre complexe³, avec la même précaution que dans \mathbf{R} : on ne divise pas par 0.

On note \mathbf{C}^* l'ensemble des complexes non nuls.

¹ Ceux que vous manipulez depuis toujours.

² Un nombre dont le carré vaut a .

³ Voir plus loin pour les détails.

Exemples 0.1 Premiers calculs

$$\blacktriangleright 1 + (-1 - i) = -i \text{ et } 2 + 3(4 + i) = 2 + 12 + 3i = 14 + 3i.$$

$$\blacktriangleright 2 + \frac{1}{2}(2 + i) = 2 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{i}{2} = 3 + \frac{i}{2}.$$

$$\blacktriangleright (1 + i) \times (5 - i) = 5 - i + 5i - i^2 = 5 + 4i - (-1) = 6 + 4i.$$

$$\blacktriangleright (1 + 2i)^2 = (1 + 2i)(1 + 2i) = 1 + 2i + 2i + (2i)^2 = 1 + 4i + 4i^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i.$$

Notons tout de suite que les identités remarquables usuelles restent valables dans \mathbf{C} , si z et z' sont deux nombres complexes, alors

$$(z + z')^2 = z^2 + 2zz' + z'^2, (z - z')^2 = z^2 - 2zz' + z'^2 \text{ et } (z + z')(z - z') = z^2 - z'^2.$$

Ainsi, le calcul précédent s'écrit plus simplement

$$(1 + 2i)^2 = 1^2 + 2 \times 1 \times (2i) + (2i)^2 = 1 + 4i - 4 = -3 + 4i.$$

► Les puissances de i sont aisées à calculer :

$$i^2 = -1, i^3 = (i^2) \times i = -i, i^4 = i^3 \times i = -i^2 = 1 \text{ puis } i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i, i^6 = i^4 \times i^2 = -1, \dots$$

► $i \times (-i) = -i^2 = 1$, si bien qu'en divisant par i les deux membres de l'égalité, on obtient $\frac{1}{i} = -i$.

Remarquons tout de suite que $z + z' = z' + z$ et $zz' = z'z$ (on dit alors que l'addition et la multiplication sont commutatives), ce qui découle du fait que la l'addition et la multiplication de réels sont des opérations commutatives.

L'écriture $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbf{R}^2$ est appelée **forme algébrique** du complexe z .

L'unicité de l'écriture sous forme algébrique signifie que $a + ib = a' + ib'$ si et seulement si

$$\text{on a à la fois } \begin{cases} a = a' \\ b = b' \end{cases}.$$

Définition 0.2 – Si $z = a + ib \in \mathbf{C}$, avec $a, b \in \mathbf{R}$ alors on appelle :

- **partie réelle** de z le nombre réel a , que l'on note $\operatorname{Re}(z)$
- **partie imaginaire** de z le nombre réel b , que l'on note $\operatorname{Im}(z)$

On a donc $z = \operatorname{Re}(z) + i \operatorname{Im}(z)$.

Un nombre complexe est donc entièrement caractérisé par la donnée de sa partie réelle et de sa partie imaginaire.

Si $\operatorname{Im}(z) = 0$, alors on confond le complexe z et le réel $\operatorname{Re}(z)$, de sorte qu'on considère que $\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$.

Un complexe z est donc un réel si et seulement si $\operatorname{Im}(z) = 0$ c'est-à-dire $z = \operatorname{Re}(z)$. Un complexe dont la partie réelle est nulle est appelé **imaginaire pur**.

On note $i\mathbf{R}$ l'ensemble des imaginaires purs, c'est-à-dire l'ensemble des ib , $b \in \mathbf{R}$.

Proposition 0.3 : Si z, z' sont deux nombres complexes, alors on a

$$\operatorname{Re}(z + z') = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \text{ et } \operatorname{Im}(z + z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z').$$

Démonstration. Si $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$, avec a, a', b, b' des nombres réels, alors

$$z + z' = a + ib + a' + ib' = \underbrace{a + a'}_{\in \mathbf{R}} + i \underbrace{(b + b')}_{\in \mathbf{R}}$$

et donc par unicité de la partie réelle et de la partie imaginaire,

$$\operatorname{Re}(z + z') = a + a' = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z') \text{ et } \operatorname{Im}(z + z') = b + b' = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z').$$

□

Si $z = a + ib$, avec a, b réels, est un nombre complexe non nul⁴ alors z possède un inverse car si on note $z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2}$, alors

$$zz^{-1} = (a + ib) \left(\frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2} \right) = \frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2} + i \left(-\frac{ab}{a^2 + b^2} + \frac{ab}{a^2 + b^2} \right) = 1.$$

Ceci implique notamment que, à l'instar de ce qui se passe dans \mathbf{R} , si z et z' sont deux complexes tels que $zz' = 0$, alors $z = 0$ ou $z' = 0$.

En effet, supposons que $zz' = 0$, et que z soit non nul. Alors en multipliant $zz' = 0$ par z^{-1} , il vient

$$z^{-1}zz' = 0 \text{ donc } 1 \cdot z' = 0 \text{ et ainsi } z' = 0.$$

Autrement dit

Une égalité entre deux complexes signifie qu'on a deux égalités entre réels.

⚠ Danger !

La partie réelle (resp. imaginaire) d'un produit n'est pas le produit des parties réelles (resp. imaginaires).

⁴ C'est-à-dire tel que $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.

Autrement dit

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

Ceci nous permet également de définir la division de deux complexes en posant, pour $z' \neq 0$, $\frac{z}{z'} = z(z')^{-1}$.

On notera en général $\frac{1}{z}$ plutôt que z^{-1} .

Exemple 0.4

En utilisant les formules données ci-dessus, on obtient

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1}{1^2+1^2} - i \frac{1}{1^2+1^2} = \frac{1}{2}(1-i).$$

Et en effet, on a bien

$$(1+i) \frac{1-i}{2} = \frac{1}{2}(1-i)(1+i) = \frac{1}{2}(1-i^2) = \frac{1}{2}(1+1) = 1.$$

En pratique, il ne sera pas nécessaire de connaître ces formules pour calculer l'inverse d'un nombre complexe (voir le corollaire 0.13 ci-dessous).

Comme pour les nombres réels, on a $\frac{1}{\frac{z}{z'}} = \frac{z'}{z}$, autrement dit, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse.

Exemple 0.5

$$\frac{1+i}{\frac{2}{i}} = (1+i) \frac{i}{2} = \frac{i-1}{2}.$$

Enfin, les règles de calcul usuelles avec les fractions restent valables pour les quotients de nombres complexes :

- ▶ pour multiplier deux fractions, on multiplie numérateur et dénominateur :

$$\frac{z_1}{z_2} \times \frac{z_3}{z_4} = \frac{z_1 z_3}{z_2 z_4}.$$

- ▶ pour ajouter deux fractions, on commence par une mise au même dénominateur :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad+bc}{bd}.$$

⚠ Attention !

On n'ajoute surtout pas les numérateurs et les dénominateurs : la formule

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

est aussi fautive pour les complexes qu'elle l'est pour les réels.

Exemples 0.6

$$\frac{6+3i}{1+i} \times \frac{6-3i}{i} = \frac{(6+3i)(6-3i)}{i(1+i)} = \frac{36-9i^2}{i+i^2} = \frac{45}{-1+i}.$$

$$\frac{1+2i}{4-i} + \frac{3}{2+i} = \frac{(1+2i)(2+i) + 3(4-i)}{(4-i)(2+i)} = \frac{2+4i+i+2i^2+12-3i}{8+2i-i^2} = \frac{12+2i}{9+2i}.$$



On n'écrira pas d'inégalités entre nombres complexes, il n'y a pas de notion naturelle de supérieur/inférieur sur les complexes.

Donc les inégalités $2+i \leq -3+2i$ et $-3 \leq 2+i$ ne sont ni vraies ni fausses, elles n'ont tout simplement **aucun sens**.

On n'utilisera donc des inégalités que pour les nombres réels, comme vous le faisiez jusqu'à présent.

0.1.2 Représentation géométrique des nombres complexes

Tout comme un point dans le plan, un nombre complexe est caractérisé par la donnée de deux nombres réels : pour un point il s'agit de l'abscisse et de l'ordonnée, pour un complexe il s'agit de la partie réelle et de la partie imaginaire.

Ceci permet de faire correspondre à chaque point du plan un unique nombre complexe.

Définition 0.7 – Considérons un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) du plan. Alors tout point M est caractérisé de manière unique par ses coordonnées (x, y) .
 Si M a pour coordonnées (x, y) , on dit que le complexe $z = x + iy$ est l'**affiche** de M .
 On dit également que M est l'**image** du complexe $z = x + iy$.
 De même, si $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ est un vecteur du plan, on dit que le complexe $z = x + iy$ est l'afixe de \vec{u} .

Les réels sont donc les complexes dont l'image est située sur l'axe des abscisses, et les imaginaires purs ceux dont l'image est situé sur l'axe des ordonnées.




FIGURE 0.1 – L'image de quelques complexes dans le plan.

0.1.3 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 0.8 – Si $z = a + ib$ est un complexe, avec a, b réels, alors le complexe $\bar{z} = a - ib$ est appelé **nombre conjugué**⁵ de z .
 Autrement dit, $\bar{z} = \text{Re}(z) - i \text{Im}(z)$.

⁵ Ou plus simple conjugué.

Géométriquement, l'image de \bar{z} est le symétrique du point d'affixe z par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.




FIGURE 0.2 – Quelques complexes et leurs conjugués (on confond ici un complexe et son image dans le plan).

Remarques. ► Un complexe z est réel si et seulement si $z = \bar{z}$.

► De même, $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

► Notons tout de suite que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\overline{\bar{z}} = z$.

En effet, si $z = a + ib$, alors $\bar{z} = a - ib$ et donc $\overline{\bar{z}} = \overline{a - ib} = a - i(-b) = a + ib$.

Géométriquement

Un point est invariant par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses si et seulement si il est sur cet axe.

Proposition 0.9 : Si z et z' sont deux complexes, alors

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}' \text{ et } \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'.$$

De plus, si $z \neq 0$, alors $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$ et plus généralement, $\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}$.

Démonstration. Notons $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ sous forme algébrique⁶. Alors

$$\overline{z + z'} = \overline{(a + a') + i(b + b')} = (a + a') - i(b + b') = (a - ib) + (a' - ib') = \bar{z} + \bar{z}'.$$

De même,

$$\overline{zz'} = \overline{(a - ib)(a' - ib')} = (aa' - bb') - i(ab' + a'b) = (aa' - bb') + i(a'b + ab') = \bar{z}\bar{z}'.$$

Et si $z \neq 0$, en utilisant le point précédent, on a

$$\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\bar{z}} \text{ et } \frac{1}{\bar{z}}z = \bar{1} = 1.$$

Et donc $\frac{1}{\bar{z}} = \overline{\left(\frac{1}{z}\right)}$.

Enfin, en combinant les deux formules précédentes,

$$\overline{\left(\frac{z'}{z}\right)} = \overline{z' \frac{1}{z}} = \bar{z}' \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \bar{z}' \frac{1}{\bar{z}} = \frac{\bar{z}'}{\bar{z}}.$$

□

Proposition 0.10 : Si $z \in \mathbf{C}$, alors $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$ et $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$.

Démonstration. Si $z = a + ib$ est la forme algébrique de z , $\bar{z} = a - ib$ de sorte que $z + \bar{z} = (a + ib) + (a - ib) = 2a = 2 \operatorname{Re}(z)$.

Et $z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 2ib = 2i \operatorname{Im}(z)$. □

0.1.4 Module d'un nombre complexe

Définition 0.11 – Si $z = a + ib \in \mathbf{C}$, avec a, b réels, on appelle **module de z** le réel positif défini par $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$.

Géométriquement, $|z|$ n'est autre que la longueur du segment joignant l'origine O au point d'affixe z .




FIGURE 0.3 – Le module d'un complexe. Merci Pythagore !

En particulier, si z est un réel, alors $|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2} = \sqrt{z^2}$ est égal à la valeur absolue de z .

Proposition 0.12 : Si $z \in \mathbf{C}$, alors $z\bar{z} = |z|^2$.

⁶ Donc avec a, b, a', b' des réels.

Remarque

Ceci justifie qu'on utilise la même notation pour le module et la valeur absolue, puisque dans le cas d'un réel, ces deux notations désignent la même quantité.

Démonstration. C'est un simple calcul, si $z = a + ib$, alors,

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib) = a^2 - \underbrace{i^2}_{=-1} b^2 = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

□

Corollaire 0.13 – Si $z \in \mathbb{C}^*$, alors $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

Cette formule s'écrit encore, si $z = a + ib$, sous la forme $\frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$.

Exemples 0.14

$$\blacktriangleright \frac{1}{i} = \frac{1-i}{i-i} = \frac{-i}{-i^2} = -i.$$

$$\blacktriangleright \frac{1}{3-2i} = \frac{3+2i}{(3-2i)(3+2i)} = \frac{3+2i}{9-(2i)^2} = \frac{3+2i}{9+4} = \frac{1}{13}(3+2i).$$

▶ La forme algébrique du quotient de deux nombres complexes peut toujours se calculer en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Ainsi, on a

$$\frac{2-i}{1-i} = \frac{(2-i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2-i+2i-i^2}{1^2-i^2} = \frac{3+i}{2}.$$

Et de même,

$$\begin{aligned} \frac{5-4i}{\frac{1}{2}+2i} &= \frac{(5-4i)\left(\frac{1}{2}-2i\right)}{\left(\frac{1}{2}+2i\right)\left(\frac{1}{2}-2i\right)} = \frac{\frac{5}{2}-10i-2i+8i^2}{\frac{1}{4}-4i^2} = \frac{-\frac{11}{2}-12i}{\frac{17}{4}} \\ &= \left(-\frac{11}{2}-12i\right) \frac{4}{17} = \frac{-22-48i}{17}. \end{aligned}$$

Proposition 0.15 (Propriétés du module) :

1. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$
2. Si $z \in \mathbb{C}$, alors $|\bar{z}| = |z|$. De plus, on a $z = 0$ si et seulement si $|z| = 0$.
3. Si z, z' sont deux complexes, alors $|zz'| = |z| \cdot |z'|$ et si $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

En particulier, $|-z| = |z|$ et $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$.

Démonstration. 1. Soit $z \in \mathbb{C}$, $z = a + ib$, avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

$$\text{Alors } |\operatorname{Re}(z)|^2 = |a|^2 = a^2 \leq a^2 + b^2 \leq |z|^2.$$

Et donc par croissance de la racine carrée, $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$.

$$\text{De même, } |\operatorname{Im}(z)| = |b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |z|.$$

2. Si $z = a + ib$, alors $\bar{z} = a - ib$, de sorte que $|\bar{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$.

$$\text{De plus, on a } |z| = 0 \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 0.$$

Or, une somme de nombres positifs est nulle si et seulement si tous ces nombres sont nuls, donc

$$|z| = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 = 0 \\ b^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow z = 0.$$

3. On a

$$|zz'|^2 = zz'\overline{zz'} = zz'\overline{z}\overline{z'} = z\bar{z}z'\bar{z}' = |z|^2|z'|^2.$$

Cas d'égalité

On a alors $|\operatorname{Re}(z)| = |z|$ si et seulement si $b = 0$, soit si et seulement si $z \in \mathbb{R}$.

Géométriquement

Le seul point à distance nulle de l'origine est l'origine.

Mais des modules sont toujours positifs, donc en passant à la racine,

$$|zz'| = |z| \cdot |z'|.$$

En particulier, pour $z \neq 0$, il vient $\left| \frac{1}{z} \right| |z| = \left| z \frac{1}{z} \right| = |1| = 1$.

Et donc $\frac{1}{|z|} = \left| \frac{1}{z} \right|$.

On en déduit que si $z' \neq 0$,

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \left| z \frac{1}{z'} \right| = \left| \frac{1}{z'} \right| |z| = \frac{1}{|z'|} |z| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

□

En revanche, les choses se passent moins bien pour la somme, et le module d'une somme n'est que rarement la somme des modules. Par exemple, $|1 + i| = \sqrt{2} \neq |1| + |i|$. Plus précisément, on dispose de l'inégalité suivante.

Théorème 0.16 (Inégalité triangulaire) : Si z_1, z_2 sont deux nombres complexes, alors

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Cette inégalité est une égalité si et seulement si $z_1 = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbf{R}_+$ tel que $z_2 = \lambda z_1$.

Cas d'égalité

Le cas d'égalité signifie que les vecteurs d'affixes z_1 et z_2 sont colinéaires et de même sens.




FIGURE 0.4 – L'inégalité triangulaire : dans un triangle, la longueur d'un côté est plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés.

Démonstration. On a

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} = (z_1 + z_2) (\overline{z_1} + \overline{z_2}) \\ &= |z_1|^2 + z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1} z_2 + |z_2|^2 \\ &= |z_1|^2 + \overline{\overline{z_1} z_2} + \overline{z_1} z_2 + |z_2|^2 \\ &= |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(\overline{z_1} z_2) + |z_2|^2 \\ &\leq |z_1|^2 + 2 |\operatorname{Re}(\overline{z_1} z_2)| + |z_2|^2 \\ &\leq |z_1|^2 + 2 |\overline{z_1} z_2| + |z_2|^2 \\ &\leq |z_1|^2 + 2 |z_1| |z_2| + |z_2|^2 \\ &\leq (|z_1| + |z_2|)^2. \end{aligned}$$

Donc $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.

De plus il y a égalité si et seulement si chacune des inégalités ci-dessus est une égalité, soit si et seulement si $|\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)| = \operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)$ et $|\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)| = |\overline{z_1}z_2|$.

La première condition équivaut au fait que $\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)$ soit positif, et la seconde au fait que $\overline{z_1}z_2$ soit réel.

Donc au final, il y a égalité si et seulement si $\overline{z_1}z_2 \in \mathbf{R}_+$.

Si $z_1 = 0$, alors il y a égalité.

Si $z_1 \neq 0$, si il y a égalité dans l'inégalité triangulaire, alors il existe $\lambda \in \mathbf{R}_+$ tel que $\overline{z_1}z_2 = \lambda$

$$\text{et donc } z_2 = \lambda \frac{1}{\overline{z_1}} = \underbrace{\frac{\lambda}{|z_1|^2}}_{\geq 0} z_1.$$

Et inversement, si $z_2 = \lambda z_1$ avec $\lambda \in \mathbf{R}_+$, alors $z_1 + z_2 = (1 + \lambda)z_1$ et donc

$|z_1 + z_2| = (1 + \lambda)|z_1| = |z_1| + \lambda|z_1| = |z_1| + |z_2|$, donc l'inégalité triangulaire est une égalité.

Au final, il y a bien égalité si et seulement si $z_1 = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbf{R}_+$ tel que $z_2 = \lambda z_1$. \square

Corollaire 0.17 – *Quels que soient les complexes z et z' , on a $||z| - |z'|| \leq |z + z'|$.*

Terminologie

◀ Cette inégalité s'appelle l'inégalité triangulaire renversée.

Démonstration. La preuve est la même que dans le cas réel. \square

Notons qu'en utilisant à la fois l'inégalité triangulaire et l'inégalité triangulaire renversée, et en changeant z' en son opposé, on arrive à

$$||z| - |z'|| \leq |z \pm z'| \leq |z| + |z'|.$$

Le corollaire suivant est une généralisation de l'inégalité triangulaire à une somme de n nombres complexes. Sa preuve peut être omise en première lecture, notamment si vous n'êtes pas à l'aise avec le symbole \sum .

Corollaire 0.18 – *Si z_1, \dots, z_n sont des complexes, alors $\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|$.*

Démonstration. La preuve se fait par récurrence sur $n \in \mathbf{N}^*$, comme pour le cas réel. Si $n = 1$ c'est évident, et si $n = 2$, c'est le théorème précédent.

Supposons donc que pour tous complexes z_1, \dots, z_n , $\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|$ et soient z_1, \dots, z_{n+1} $n + 1$ nombres complexes. Alors

$$\begin{aligned} \left| \sum_{i=1}^{n+1} z_i \right| &= \left| \sum_{i=1}^n z_i + z_{n+1} \right| \\ &\leq \left| \sum_{i=1}^n z_i \right| + |z_{n+1}| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |z_i| + |z_{n+1}| \\ &\leq \sum_{i=1}^{n+1} |z_i|. \end{aligned}$$

C'est le théorème précédent.

Hypothèse de récurrence.

Donc par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$ et pour tous complexes z_1, \dots, z_n ,

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|. \quad \square$$

Donnons enfin une interprétation géométrique du module de $|z_1 - z_2|$ où z_1 et z_2 sont deux complexes.

Notons $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$ les formes algébriques de z_1 et z_2 , donc avec x_1, x_2, y_1, y_2 réels.

Soient alors $A_1(x_1, y_1)$ et $A_2(x_2, y_2)$ les points d'affixes respectives z_1 et z_2 .

La distance entre A_1 et A_2 est donc $A_1A_2 = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.

Or, on a également

$$|z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Donc $|z_1 - z_2|$ est la distance entre les points d'affixes z_1 et z_2 .

0.2 FORME EXPONENTIELLE D'UN NOMBRE COMPLEXE

Souvenons-nous qu'il est possible d'identifier les nombres complexes aux points du plan. Le plus simple pour caractériser un point du plan est de se donner son abscisse et son ordonnée, ce qui en termes de nombres complexes, correspond à la partie réelle et la partie imaginaire. C'est ce que nous avons appelé la forme algébrique d'un complexe. Elle est particulièrement adaptée aux calculs de sommes, mais les calculs de produits ou de quotients sont plus désagréables.

Mais il existe un autre moyen de repérer un point M du plan : il suffit de se donner sa distance à l'origine, ainsi que l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.

En effet, si $OM = r$, alors M est sur le cercle \mathcal{C}_r de centre O et de rayon r , et si on note $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$, alors M est le seul point de \mathcal{C}_r pour lequel $(\vec{i}, \overrightarrow{OM}) = \theta$.




FIGURE 0.5 – Un point du plan est repéré par un rayon et un angle.

Puisque dans cette partie nous allons être amenés à manipuler des angles, profitons-en pour introduire une notation que vous avez peut-être déjà manipulée au lycée.

Vous savez qu'un angle est bien défini «à 2π près», au sens où $\theta, \theta + 2\pi$ et $\theta - 4\pi$ définissent les mêmes angles.

Si θ_1 et θ_2 sont deux réels, on notera alors $\theta_1 \equiv \theta_2 [2\pi]$ s'il existe un entier relatif $k \in \mathbf{Z}$ tel que $\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$. Autrement dit, si θ_1 et θ_2 définissent les mêmes angles.

Par exemple, $\frac{\pi}{2} \equiv \frac{5\pi}{2} [2\pi]$ et $-\frac{2\pi}{3} \equiv \frac{10\pi}{3} [2\pi]$.

Terminologie

On dit que z_1 et z_2 sont congrus modulo 2π .

0.2.1 L'ensemble des nombres complexes de module 1

Définition 0.19 – On note \mathbf{U} l'ensemble des nombres complexes de module 1 :

$$\mathbf{U} = \{z \in \mathbf{C}, |z| = 1\}.$$

Remarque. Si z est un complexe non nul, alors $\frac{z}{|z|} \in \mathbf{U}$.

En effet, $\left| \frac{z}{|z|} \right| = \frac{1}{|z|} |z| = 1$.

Autrement dit

\mathbf{U} est l'ensemble des affixes des points du cercle trigonométrique.

Exemples 0.20

► $1, i, -i$ et -1 sont dans \mathbf{U} .

Puisque $|1+i| = \sqrt{2}$, $1+i \notin \mathbf{U}$ mais $\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) \in \mathbf{U}$.

► Soit $z \in \mathbf{C} \setminus \{1\}$. Alors $\frac{z+1}{z-1} \in i\mathbf{R}$ si et seulement si $z \in \mathbf{U}$.

En effet, on a $\frac{z+1}{z-1} = \frac{(z+1)(\bar{z}-1)}{|z-1|^2} = \frac{|z|^2 - z + \bar{z} - 1}{|z-1|^2} = \frac{|z|^2 - 1}{|z-1|^2} - i \frac{2\operatorname{Im}(z)}{|z-1|^2}$.

Et donc ce nombre est imaginaire pur si et seulement si $|z|^2 - 1 = 0$, soit si et seulement si $|z| = 1$ c'est-à-dire lorsque $z \in \mathbf{U}$.

Proposition 0.21 : $1 \in \mathbf{U}$ et pour tous $z_1, z_2 \in \mathbf{U}$, $z_1 z_2 \in \mathbf{U}$ et $\frac{1}{z_1} \in \mathbf{U}$.

Démonstration. Cela découle directement des propriétés du module. □

Proposition 0.22 : Si $z \in \mathbf{C}$ est non nul, alors $z \in \mathbf{U}$ si et seulement si $\frac{1}{z} = \bar{z}$.

Démonstration. Nous savons que $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ et donc $\frac{1}{z} = \bar{z} \Leftrightarrow |z|^2 = 1 \Leftrightarrow z \in \mathbf{U}$. □

En particulier

◀ L'inverse de i est son conjugué $-i$.

0.2.2 Notation $e^{i\theta}$

Proposition 0.23 : Soit $z \in \mathbf{U}$. Alors il existe $\theta \in \mathbf{R}$ tel que $z = \cos \theta + i \sin \theta$. Un tel réel θ est appelé **un argument de z** .

Démonstration. Soit $z = a + ib$ un élément de \mathbf{U} . Alors $|z|^2 = 1 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 1$.

Autrement dit, (a, b) appartient au cercle trigonométrique \mathcal{C} .

Mais alors il existe $\theta \in \mathbf{R}$, unique modulo 2π , tel que $(a, b) = (\cos \theta, \sin \theta)$.

Et donc $z = \cos \theta + i \sin \theta$. □

Terminologie

◀ Il existe une infinité de tels réels θ , donc on veillera bien à dire **un** argument, et pas l'argument.

Définition 0.24 – Pour $\theta \in \mathbf{R}$, on note $e^{i\theta}$ le nombre complexe défini par

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Remarques. ► Notons qu'en particulier, $e^{i0} = 1$. Et plus généralement, pour tout $k \in \mathbf{Z}$, $e^{2ik\pi} = 1$.

On a également $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ et $-1 = e^{i\pi}$.

Cette dernière formule s'écrit encore $e^{i\pi} + 1 = 0$.

► Avec cette notation, $\mathbf{U} = \{e^{i\theta}, \theta \in \mathbf{R}\}$.

Graphiquement, le point M_θ d'affixe $e^{i\theta}$ est le point du cercle trigonométrique tel que $(\vec{i}, \overrightarrow{OM_\theta}) = \theta$.




Pour l'instant il ne s'agit que d'une notation, et a priori, rien ne justifie qu'il existe un quelconque rapport avec la fonction exponentielle que nous utilisons en analyse.

Il y a bien un lien entre les deux, mais il ne sera clarifié qu'en seconde année de prépa.

En particulier, vous noterez bien que je n'ai à aucun moment défini ce que serait le logarithme d'un nombre complexe,

Pour l'instant, contentons-nous de constater que $e^{i\theta}$ partage bien des propriétés avec l'exponentielle réelle dont nous avons l'habitude :



Proposition 0.25 : Soient $\theta, \theta_1, \theta_2$ des réels. Alors

1. $|e^{i\theta}| = 1$. Et donc, $e^{i\theta} \in \mathbf{U}$
2. $\forall k \in \mathbf{Z}, e^{i(\theta+2k\pi)} = e^{i\theta}$
3. $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$ si et seulement si $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}$
4. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1+\theta_2)}$
5. $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$, donc $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.
6. $\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

⁷ $e^{i\theta} \in \mathbf{U}$, donc son inverse est égal à son conjugué.

Démonstration. 1. On a

$$|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \sqrt{1} = 1.$$

2. Pour $k \in \mathbf{Z}$, on a, par 2π -périodicité des fonctions cos et sin

$$e^{i(\theta+2k\pi)} = \cos(\theta + 2k\pi) + i \sin(\theta + 2k\pi) = \cos(\theta) + i \sin(\theta) = e^{i\theta}.$$

3. Nous savons qu'à tout point du cercle trigonométrique correspond un unique $\theta \in]-\pi, \pi]$. Autrement dit, pour $\theta_1, \theta_2 \in]-\pi, \pi]$, on a $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$ si et seulement si $\theta_1 = \theta_2$.

Mais il existe un (unique) entier k_1 tel que $\theta_1 + 2k_1\pi \in]-\pi, \pi]$ et de même il existe un unique entier k_2 tel que $\theta_2 + 2k_2\pi \in]-\pi, \pi]$.

Si $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$, alors $e^{i\theta_1} = e^{i(\theta_1+2k_1\pi)} = e^{i(\theta_2+2k_2\pi)}$ de sorte que

$$\theta_1 + 2k_1\pi = \theta_2 + 2k_2\pi \text{ et donc } \theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}.$$

La réciproque est évidente d'après le point précédent.

4. Il s'agit d'utiliser les formules de trigonométrie :

$$\begin{aligned} e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} &= (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= (\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2) \\ &= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1+\theta_2)}. \end{aligned}$$

5. On a $e^{i\theta} e^{-i\theta} = e^{i(\theta-\theta)} = 1$. Et donc $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.

Et puisque $e^{i\theta}$ est de module 1, son inverse est égal à son conjugué, de sorte que

$$\overline{e^{i\theta}} = \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}.$$

6. $\frac{e^{i\theta_1}}{e^{i\theta_2}} = e^{i\theta_1} \frac{1}{e^{i\theta_2}} = e^{i\theta_1} e^{-i\theta_2} = e^{i(\theta_1-\theta_2)}$.

□

Astuce

Si on utilise ici les formules d'addition pour prouver le résultat, c'est un bon moyen de les retrouver si on les oublie : $\cos(\theta_1 + \theta_2)$ est la partie réelle de $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2}$.

0.2.3 Forme exponentielle d'un nombre complexe, argument(s)

Proposition 0.26 : Soit $z \in \mathbf{C}$. Alors il existe $(r, \theta) \in \mathbf{R}_+ \times \mathbf{R}$ tel que

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

On a alors $r = |z|$, et si $z \neq 0$, alors θ est unique modulo 2π , autrement dit si r_1, r_2 sont deux réels strictement positifs, et si θ_1, θ_2 sont deux réels tels que $z = r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2}$, alors $r_1 = r_2 = |z|$ et $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}$.

Démonstration. Si $z = 0$, alors pour tout $\theta \in \mathbf{R}$, $z = 0e^{i\theta}$.

Et si $z \neq 0$, alors $\frac{z}{|z|}$ est de module 1, donc dans \mathbf{U} .

Par conséquent, il existe θ tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$ donc $z = \underbrace{|z|}_{\in \mathbf{R}_+} e^{i\theta}$.

Si $z \in \mathbf{C}$ s'écrit $z = re^{i\theta}$, avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbf{R}$, alors $|z| = |r| \underbrace{|e^{i\theta}|}_{=1} = r$.

Et donc pour $z \neq 0$, si $z = r_1 e^{i\theta_1} = r_2 e^{i\theta_2}$, alors $r_1 = r_2 = |z| \neq 0$, de sorte que $e^{i\theta_1} = e^{i\theta_2}$ et donc $\theta_1 \equiv \theta_2 \pmod{2\pi}$. \square

L'écriture $z = re^{i\theta}$, avec $r \in \mathbf{R}_+$ est appelée **forme exponentielle** de z .

Notons que cette écriture est particulièrement bien adaptée au calcul de produits, puisque si $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ et $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, alors $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$.



Méfions tout de même d'une chose : r doit être positif, et pas seulement réel !

Par exemple, $z = -2e^{i\pi/6}$ n'est pas une forme exponentielle, car son module ne peut valoir -2 .

En revanche, en notant que $-1 = e^{i\pi}$, alors $z = 2e^{7i\pi/6}$, qui est bien une écriture sous forme exponentielle, avec 2 pour module.

Remarque. Notons que si $z = re^{i\theta}$, alors $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$, cette écriture étant parfois appelée **forme trigonométrique** du complexe z .

On lui préférera toutefois la forme exponentielle, qui lui est équivalente et est plus facile à manipuler.

Définition 0.27 – Soit $z \in \mathbf{C}$. On appelle **argument** de z tout réel θ tel que $z = |z|e^{i\theta}$.

Si z est non nul, et possède θ comme argument, alors les arguments de z sont exactement les éléments de $\theta + 2\pi\mathbf{Z} = \{\theta + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}\}$.

En revanche, $z \in \mathbf{C}^*$ possède un unique argument dans $] -\pi, \pi]$, qu'on appelle **argument principal** de z , et qu'on note $\arg(z)$.

Méthode

Bien qu'il soit possible de calculer des produits/quotients de complexes sous forme algébrique, on privilégiera autant que possible la forme exponentielle.

Autrement dit

Deux arguments de z sont congrus modulo 2π .

Remarques. ► Géométriquement, si M est le point d'affixe $z \neq 0$, alors $\arg(z)$ est l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.




FIGURE 0.6 – Interprétation graphique de la forme exponentielle d'un complexe.

Puisque $|z|$ est la distance OM , définir un complexe par sa forme exponentielle $re^{i\theta}$, c'est définir M par sa distance à l'origine et l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.

Et de même, si \vec{u} a pour affixe $z = re^{i\theta}$, alors $r = \|\vec{u}\|$ et $\theta \equiv \left(\vec{i}, \vec{u}\right) [2\pi]$.

► Un complexe non nul z est un réel positif si et seulement si $\arg(z) = 0$ et c'est un réel négatif si et seulement si $\arg(z) = \pi$.

Enfin, $z \in i\mathbf{R}$ si et seulement si $\arg(z) = \pm \frac{\pi}{2} [\pi]$.

Exemples 0.28

► $-i = 0 - i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

Ceci est cohérent avec le fait que $-i = \frac{1}{i} = \frac{1}{e^{i\frac{\pi}{2}}} = e^{-i\frac{\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

► Soit $z = 1 + i$. Alors $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
Et alors

$$z = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Donc $\frac{\pi}{4}$ est un argument de z , et même l'argument principal de z .

► Soit $z = \sqrt{3} - 3i$. Alors $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.
Et donc

$$z = 2\sqrt{3} \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2\sqrt{3} \left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right) = 2\sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Donc $-\frac{\pi}{3}$ est l'argument principal de z .

Notons que $\frac{5\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi$ est également un argument de z .

Proposition 0.29 : Soient z, z' deux complexes non nuls. Alors

1. $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
2. $\arg\left(\frac{1}{z}\right) = \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
3. $\forall n \in \mathbf{Z}, \arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$

Démonstration. 1. Si $z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$, alors $zz' = rr'e^{i(\theta+\theta')}$, de sorte que $\theta + \theta' = \arg(z) + \arg(z')$ est un argument de zz' . Et donc est congru à $\arg(zz')$ modulo 2π .

2. Si $z = re^{i\theta}$, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$. Et donc $-\theta$ est un argument de \bar{z} . Notons que sauf si $\theta = \pi$, $-\arg(z)$ est dans $] -\pi, \pi]$ et donc est égal à $\arg(\bar{z})$.

3. Si $n \geq 0$, la preuve se fait par récurrence en utilisant le point 1.

Et si $n < 0$, il suffit de noter que $z^n = \left(\frac{1}{z}\right)^{-n}$, avec $-n \geq 0$. Et donc

$$\arg(z^n) \equiv -n \arg \frac{1}{z} \equiv n \arg(z) [2\pi].$$

□

Revenons sur le cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire : si $z_1 \neq 0$ alors nous avons prouvé que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbf{R}_+$ tel que $z_2 = \lambda z_1$.

Mais alors, si $z_1 = re^{i\theta}$, il vient donc $z_2 = \underbrace{\lambda r}_{\in \mathbf{R}_+} e^{i\theta_1}$.

Et donc z_1 et z_2 ont même argument θ_1 .

Et inversement, si z_1 et z_2 ont même argument θ , $z_1 = |z_1|e^{i\theta}$, $z_2 = |z_2|e^{i\theta}$ et donc en

Méthode

Déterminer un argument d'un complexe non nul z , c'est déterminer un $\theta \in \mathbf{R}$ tel que $z = |z|e^{i\theta}$, soit encore $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$.
On commencera donc systématiquement par calculer $|z|$, puis par factoriser z par ce module de manière à obtenir un complexe de module 1, qui est donc de la forme $e^{i\theta}$, la valeur de θ restant à déterminer.

Terminologie

Avez-vous bien saisi la subtilité ? Un argument et pas l'argument, mais si on parle d'argument principal, alors il y en a un seul, qu'on appelle donc l'argument principal.

Égal ou congru ?

Si $\arg(z) + \arg(z') \in] -\pi, \pi]$ alors c'est l'argument principal de zz' , mais sinon il faut ajouter $\pm 2\pi$ à $\theta + \theta'$ pour tomber dans l'intervalle $] -\pi, \pi]$.

posant $\lambda = \frac{|z_2|}{|z_1|} \in \mathbf{R}_+$, on a $z_2 = \lambda z_1$, et donc il y a égalité dans l'inégalité triangulaire.

On retiendra donc que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ si et seulement si $z_1 z_2 = 0$, ou si $\arg(z_1) = \arg(z_2)$.

0.2.4 Formules de Moivre et d'Euler

Proposition 0.30 (Formules d'Euler) : Soit $\theta \in \mathbf{R}$. Alors

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. C'est un simple calcul : $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}} = 2 \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = 2 \cos \theta$ et de même

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = e^{i\theta} - \overline{e^{i\theta}} = 2i \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = 2i \sin \theta.$$

□

Exemples 0.31 Factorisation par l'angle moitié

Il est souvent judicieux de factoriser $e^{ia} \pm e^{ib}$ par $e^{i(a+b)/2}$.

Par exemple, on a

$$e^{ia} - e^{ib} = e^{i(a+b)/2} \left(e^{i(a-b)/2} - e^{i(b-a)/2} \right) = e^{i(a+b)/2} \left(e^{i(a-b)/2} - e^{-i(a-b)/2} \right) = 2i \sin \left(\frac{a-b}{2} \right) e^{i(a+b)/2}.$$

Ceci permet notamment d'obtenir à peu de frais le module et un argument de $e^{ia} \pm e^{ib}$.

Par exemple

$$e^{i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)} \left(e^{i\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right)} + e^{i\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)} \right) = 2 \cos \left(\frac{\pi}{24} \right) e^{i\frac{5\pi}{24}}.$$

Puisque $2 \cos \left(\frac{\pi}{24} \right) > 0$, c'est bien un module, et on a donc

$$\left| e^{i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{4}} \right| = 2 \cos \left(\frac{\pi}{24} \right) \text{ et } \arg \left(e^{i\frac{\pi}{6}} + e^{i\frac{\pi}{4}} \right) = \frac{5\pi}{24}.$$

De même, on a

$$\begin{aligned} 1 - e^{i\frac{\pi}{6}} &= e^{i0} - e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{12}} \left(e^{-i\frac{\pi}{12}} - e^{i\frac{\pi}{12}} \right) = -2i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{i\frac{\pi}{12}} \\ &= 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{-i\frac{\pi}{2}} e^{i\frac{\pi}{12}} = 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) e^{-i\frac{5\pi}{12}} \end{aligned}$$

si bien que $|1 - e^{i\frac{\pi}{6}}| = 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} \right)$ et $\arg \left(1 - e^{i\frac{\pi}{6}} \right) = -\frac{5\pi}{12}$.

Cette astuce permet notamment de retrouver certaines formules de trigonométrie : si θ, θ' sont deux réels, alors $\cos \theta + \cos \theta'$ est la partie réelle de $e^{i\theta} + e^{i\theta'}$. Mais

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}} \right) = 2e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} \cos \frac{\theta-\theta'}{2}.$$

Mais la partie réelle du membre de droite est $2 \cos \frac{\theta+\theta'}{2} \cos \frac{\theta-\theta'}{2}$ et donc

$$\cos \theta + \cos \theta' = 2 \cos \frac{\theta+\theta'}{2} \cos \frac{\theta-\theta'}{2}.$$

Détails

$$-i = e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Exemple 0.32 Application à la trigonométrie : linéarisation

Linéarisons $\sin^3(\theta)$, c'est-à-dire essayons de l'écrire comme somme de fonctions de la forme $\theta \mapsto \cos(k\theta)$ ou $\theta \mapsto \sin(k\theta)$. On a

$$\begin{aligned}\sin^3 \theta &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{1}{(2i)^3} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^2 (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{-8i} \left(e^{2i\theta} - \underbrace{2e^{i\theta}e^{-i\theta}}_{=1} + e^{-2i\theta} \right) (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{-8i} (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{1}{-8i} (2i \sin(3\theta) - 6i \sin(\theta)) \\ &= \frac{3}{4} \sin(\theta) - \frac{1}{4} \sin(3\theta).\end{aligned}$$

Cette écriture est particulièrement intéressante lorsqu'on cherche à déterminer une primitive de $\theta \mapsto \sin^3 \theta$. Une telle primitive est par exemple

$$\theta \mapsto -\frac{3}{4} \cos(\theta) + \frac{1}{12} \cos(3\theta).$$

Proposition 0.33 (Formule de Moivre) : Soit $\theta \in \mathbf{R}$. Alors

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Démonstration.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

□

0.3 ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ À COEFFICIENTS RÉELS

Nous savons déjà que i est un nombre dont le carré vaut -1 , autrement dit, une racine carrée de -1 . Mais alors $(2i)^2 = 4i^2 = -4$, si bien que $2i$ est une racine carrée de -4 . Et de même, $(-2i)^2 = -4$, donc $-2i$ est également une racine carrée de -4 .

Plus généralement, si a est un réel strictement négatif, alors il existe deux racines carrées de a dans \mathbf{C} , c'est-à-dire deux nombres complexes qui élevés au carré valent a . Il s'agit de $i\sqrt{-a}$ et $-i\sqrt{-a}$.

Ce sont même les seuls, puisque si $z \in \mathbf{C}$, alors

$$z^2 = a \Leftrightarrow z^2 = (i\sqrt{-a})^2 \Leftrightarrow z^2 - (i\sqrt{-a})^2 = 0 \Leftrightarrow (z - i\sqrt{-a})(z + i\sqrt{-a}) = 0 \Leftrightarrow z = i\sqrt{-a} \text{ ou } z = -i\sqrt{-a}.$$

Ainsi, tout nombre réel possède au moins une racine carrée complexe.

Ceci nous autorise alors à chercher également les solutions complexes à des équations polynomiales du second degré de la forme $ax^2 + bx + c = 0$, avec $a, b, c \in \mathbf{R}$.

Si la méthode ne va pas du tout changer par rapport à ce que vous avez appris en première, la principale différence va venir du fait que même si le discriminant Δ est négatif, l'équation possédera toujours des solutions complexes.

Notation

Même si on a très envie de noter $i = \sqrt{-1}$, nous ne le ferons pas, et continuerons de réserver les notations \sqrt{x} ou $x^{1/2}$ au seul cas où nous les connaissons déjà : le cas où x est un réel positif.

Théorème 0.34 : Soient a, b, c trois réels avec $a \neq 0$ et soit $\Delta = b^2 - 4ac$.

1. Si $\Delta = 0$, alors l'équation $az^2 + bz + c = 0$, d'inconnue z possède une unique solution dans \mathbb{C} qui est $z = -\frac{b}{2a}$.
2. Si $\Delta > 0$, alors l'équation $az^2 + bz + c = 0$ possède deux solutions réelles qui sont $z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$.
3. Si $\Delta < 0$, alors l'équation $az^2 + bz + c = 0$ possède deux solutions complexes qui sont $z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Démonstration. Si $\Delta \geq 0$, notons $\delta = \sqrt{\Delta}$, et si $\Delta < 0$, notons $\delta = i\sqrt{-\Delta}$, de sorte qu'on a toujours $\delta^2 = \Delta$.

On a alors, pour tout $z \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a \left[z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right] \\ &= a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right] \\ &= a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right] \\ &= a \left[\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\delta}{2a} \right)^2 \right] \\ &= a \left(z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a} \right) \left(z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a} \right). \quad (\star) \end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c = 0 &\Leftrightarrow a \left(z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a} \right) \left(z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow z + \frac{b}{2a} + \frac{\delta}{2a} = 0 \text{ ou } z + \frac{b}{2a} - \frac{\delta}{2a} = 0 \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-b + \delta}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b - \delta}{2a}. \end{aligned}$$

Si $\Delta = 0$, alors ces deux nombres sont confondus, et sinon, ils sont distincts. Dans les deux cas, les factorisations annoncées découlent directement de (\star) . \square

Exemple 0.35

Réolvons l'équation $z^2 - 4z + 13 = 0$.

Son discriminant est $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 13 = -36 < 0$.

Donc l'équation n'admet pas de solution réelle, mais possède deux solutions complexes conjuguées, qui sont

$$z_1 = \frac{4 + i\sqrt{-\Delta}}{2} = \frac{4 + i\sqrt{36}}{2} = 2 + 3i \text{ et } z_2 = 2 - 3i.$$

Notons en particulier que l'équation $z^2 + 1 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = -1 < 0$ possède i et $-i$ comme uniques racines.

Donc i et $-i$ sont les seuls nombres complexes dont le carré vaut -1 .

Terminologie

Δ est appelé le **discriminant** de l'équation.

Remarque

Ces solutions ont deux complexes conjugués, de partie imaginaire non nulle, et donc ne sont pas des réels. L'équation ne possède donc toujours pas de racine réelle.

Méthode

Cette étape est la mise sous forme canonique d'un polynôme de degré 2, qu'il est bon de savoir refaire. Rappelons que la méthode est simple : il s'agit de «trouver» le bon λ de sorte que les termes en z^2 et en z soient ceux qui apparaissent en développant $(z + \lambda)^2$.

Identité remarquable.

Astuce




Lorsque $\Delta < 0$, une fois que l'on a calculé une des racines, l'autre est le conjugué de la première.

TD 0 : NOMBRES COMPLEXES

Ces exercices sont avant tout destinés à vous familiariser avec les nombres complexes si vous les découvrez. Nous vous conseillons de les chercher sérieusement, sans toutefois y passer un temps excessif.

Ne paniquez pas si certains exercices vous posent davantage de difficultés, vous pourrez toujours consulter les corrigés qui seront mis en ligne mi-août, et surtout vous n'hésitez pas à venir poser des questions à votre professeur de mathématiques à la rentrée sur les points qui vous ont posé des difficultés.

Les nombres complexes feront l'objet d'un chapitre dans les semaines suivant la rentrée, au cours duquel vous aurez l'occasion de vous familiariser davantage avec les concepts et les méthodes présentés dans ces exercices.

Pour chaque exercice, sa difficulté est indiquée par le nombre d'étoiles figurant dans la marge. Traitez en priorité les exercices  et  et ne vous attaquez aux exercices  que si les autres vous ont paru abordables.

► Calculs sous forme algébrique

Dans cette partie, on utilisera en priorité la forme algébrique d'un complexe : $z = a + ib$, avec a, b réels.

EXERCICE 1 Donner la forme algébrique des complexes suivants :



1. $z_1 = \frac{1}{\sqrt{3} + i}$

3. $z_3 = \frac{(2+i)(3+2i)}{2-i}$

2. $z_2 = \frac{2 - \sqrt{3}i}{\sqrt{3} - 2i}$

4. $z_4 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}$

EXERCICE 2 Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :



1. $iz + 3(z - i) = 0$

3. $\frac{z+1}{z-2} = 3i$

2. $(4+i)z = 4-z$

EXERCICE 3 Résoudre dans \mathbb{C} les équations suivantes :



1. $2z + 3\bar{z} = 4 - 3i$

3. $z^2 = z \times \bar{z}$

2. $3z - 2\bar{z} = -5 + i$

► Module d'un nombre complexe

EXERCICE 4 Montrer que pour tous nombres complexes z, z' , on a $|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.
On évitera le recours à la forme algébrique, et on exprimera le module d'un complexe à l'aide de son conjugué.



EXERCICE 5 Déterminer tous les nombres complexes $z \in \mathbb{C}^*$ tels que $|z| = \left| \frac{1}{z} \right| = |1 + z|$.



► Forme exponentielle et trigonométrie

Dans cette partie, on privilégiera l'écriture d'un complexe (non nul) sous sa forme exponentielle : $z = re^{i\theta}$, avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.
Pour les exercices 6 et 7, on utilisera les valeurs remarquables des fonctions \sin et \cos en $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{3}$, et on pourra utiliser avec profit un cercle trigonométrique.

EXERCICE 6 Déterminer un argument des nombres complexes suivants :



1. $z_1 = \frac{3}{2} - i\frac{3\sqrt{3}}{2}$

3. $z_3 = -\frac{9\sqrt{3}}{2} + \frac{9i}{2}$

2. $z_2 = -7i$

4. $z_4 = -4\sqrt{23} + 4\sqrt{23}i$

EXERCICE 7 Déterminer la forme exponentielle des complexes suivants :

☆☆☆

1. $z_1 = -3 - 3i$

3. $z_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

2. $z_2 = \frac{3}{2}i - \frac{3\sqrt{3}}{2}$

4. $z_4 = \frac{7}{2} + i\frac{7\sqrt{3}}{2}$

EXERCICE 8 Soit $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

☆☆☆

1. Mettre j sous forme exponentielle.
2. Calculer j^2 et j^3 , puis $1 + j + j^2$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $(1 + j)^{2n+1} = -j^{n+2}$.

EXERCICE 9

☆☆☆

1. Montrer que pour tout nombre réel θ , $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2(\theta)$.
2. En déduire des expressions de $\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ et $\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ en fonction de $\cos(\theta)$.
3. Déterminer les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$.
4. En déduire la forme exponentielle de $3(\sqrt{2} - \sqrt{6}) + 3i(\sqrt{2} + \sqrt{6})$

EXERCICE 10 Soit $\omega = \sqrt{3} + i$. Déterminer tous les $n \in \mathbf{N}$ tels que $\omega^n \in \mathbf{R}$. Tels que $\omega^n \in \mathbf{R}_+$.

☆☆☆

► Équations de degré 2

EXERCICE 11 Déterminer tous les nombres complexes z tels que $z^2 + 10z + 169 = 0$.

☆☆☆

EXERCICE 12 Soit $\theta \in [0, \pi]$.

☆☆☆

1. En se ramenant à une équation polynomiale de degré 2, déterminer tous les complexes non nuls z tels que $z + \frac{1}{z} = 2\cos(\theta)$.
2. En déduire que si $z \in \mathbf{C}^*$ vérifie $z + \frac{1}{z} = 2\cos(\theta)$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$, $z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos(n\theta)$.

► Racines carrées d'un nombre complexe

EXERCICE 13 Racines carrées d'un complexe non nul

☆☆☆

Soit $\alpha = re^{i\theta}$ un complexe non nul sous forme exponentielle (donc avec $r \in \mathbf{R}_+$ et $\theta \in \mathbf{R}$).

Le but de l'exercice est de déterminer toutes les racines carrées de α , c'est-à-dire les solutions de l'équation $(E_\alpha) : z^2 = \alpha$, d'inconnue $z \in \mathbf{C}$.

1. Prouver que $\alpha_1 = \sqrt{r}e^{i\theta/2}$ est une solution de (E_α) .
2. À l'aide d'une identité remarquable, prouver que (E_α) possède exactement deux solutions que l'on déterminera sous forme exponentielle.
3. **Application** : déterminer les racines carrées de $z_1 = 2 - 2i$ et $z_2 = \sqrt{3} - i$.
On commencera par mettre z_1 et z_2 sous forme exponentielle, puis on utilisera ce qui précède.

EXERCICE 14 On considère l'équation du second degré à coefficients complexes $(E) : z^2 - (6 + 2i)z + 4 + 2i(2\sqrt{3} + 3) = 0$.

☆☆☆

1. Montrer que pour tout nombre complexe z , $z^2 - (6 + 2i)z = (z - (3 + i))^2 - 8 - 6i$.
2. En déduire que (E) équivaut à $(z - (3 + i))^2 = 4 - 4i\sqrt{3}$.
3. Déterminer toutes les solutions de (E) sous forme algébrique.
Indication : commencer par mettre $4 - 4i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle, puis utiliser l'exercice précédent.

► Pour aller plus loin

Ces exercices sont en priorité destinés à ceux qui ont déjà une certaine aisance avec les complexes et qui souhaiteraient aller plus loin. N'essayez pas de les faire si les précédents vous ont déjà demandé beaucoup de temps, vous aurez l'occasion de refaire des exercices similaires lorsque vous traiterez le chapitre de complexes en cours.

EXERCICE 15 Déterminer tous les complexes $z \in \mathbf{C}$ tels que $z^2 = \bar{z}$.

★★★

EXERCICE 16 Racines carrées sous forme algébrique

★★★

Soit $\alpha = A + iB$ un nombre complexe non nul sous forme algébrique, avec $A, B \in \mathbf{R}$.

Il a été prouvé à l'exercice 13 que α possède exactement deux racines carrées, c'est-à-dire des solutions de l'équation $z^2 = \alpha$.

Le but de cet exercice est de décrire une méthode pour obtenir ces racines carrées sous forme algébrique.

Soit $z = a + ib$ un complexe sous forme algébrique (donc avec $a, b \in \mathbf{R}$).

1. Montrer que $z^2 = \alpha$ si et seulement si a, b sont solutions du système suivant :
$$\begin{cases} a^2 - b^2 = A \\ 2ab = B \end{cases}$$
2. En utilisant le module, prouver que si $z^2 = \alpha$, alors on a de plus $a^2 + b^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$.
3. En déduire que si $z^2 = \alpha$, alors $a^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} + A)$ et $b^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} - A)$.
4. Prouver également que si $z^2 = \alpha$, alors a et b sont de même signe si $B \geq 0$ et de signes opposés si $B < 0$.
5. **Application** : déterminer sous forme algébrique les racines carrées de $-1 + i$ et de $-5 - 12i$.

EXERCICE 17

★★★

1. Prouver que pour tous complexes a et b , $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
2. Linéariser (c'est-à-dire écrire sous forme de somme de $\cos(kx)$ ou $\sin(kx)$, $k \in \mathbf{N}$) les expressions suivantes :

(a) $\cos^4(x)$

(b) $\cos^3(x) + 2\sin^3(x)$

(c) $\cos^2(x)\sin^3(x)$

3. En déduire des primitives des fonctions correspondantes.

EXERCICE 18 Donner les nombres suivants sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique, où n est un entier naturel et $\theta \in \mathbf{R}$

★★★

1. $z_1 = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i}\right)^n$

2. $z_2 = \frac{(1 - i)^n - \sqrt{2}^n}{(1 + i)^n - \sqrt{2}^n}$

3. $z_3 = (1 + \cos(\theta) + i\sin(\theta))^{2n}$

4. $z_4 = \frac{(1 + i)^n - (1 - i)^n}{i}$

CORRECTION DES EXERCICES DU TD 0

SOLUTION DE L'EXERCICE 1

$$1. \text{ On a } z_1 = \frac{\sqrt{3} - i}{(\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)} = \frac{\sqrt{3} - i}{9 - i^2} = \frac{\sqrt{3}}{10} - i \frac{\sqrt{3}}{10}.$$

2. On a

$$z_2 = \frac{(2 - i\sqrt{3})(\sqrt{3} + 2i)}{(\sqrt{3} - 2i)(\sqrt{3} + 2i)} = \frac{2\sqrt{2} - 3i + 4i - i^2 2\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2 - 4i^2} = \frac{4\sqrt{3} + i}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7} + \frac{i}{7}.$$

3. On a cette fois

$$z_3 = \frac{(2+i)^2(3+2i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{(4+4i+i^2)(3+2i)}{4-i^2} = \frac{(3+4i)(3+2i)}{5} \\ = \frac{1+18i}{5} = \frac{1}{5} + i \frac{18}{5}.$$

4. On a

$$z_4 = \frac{(1+i\sqrt{3})^2}{(1+i\sqrt{3})(1-i\sqrt{3})} = \frac{1+2i\sqrt{3}-3}{1-3i^2} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 2

Notons que la plupart de ces équations se ramènent à une équation du premier degré, de la forme $az + b = 0$, qui se résout exactement comme dans \mathbf{R} : elle possède pour unique solution $z = -\frac{b}{a}$.

1. L'équation s'écrit encore $z(3+i) - 3i = 0$, soit $z(3+i) = 3i$, donc l'unique solution est $z = \frac{3i}{3+i}$.

Cette solution peut se mettre sous forme algébrique de la manière suivante :

$$\frac{3i}{3+i} = \frac{3i(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{9i-3i^2}{9-i^2} = \frac{3+9i}{10}.$$

2. Cette fois l'équation s'écrit $(5+i)z = 4$, qui possède pour unique solution

$$z = \frac{4}{5+i} = \frac{4(5-i)}{5^2-i^2} = \frac{20-4i}{26} = \frac{10-2i}{13}.$$

3. L'équation n'a de sens que pour $z \neq 2$. Et alors pour un tel z , on a $\frac{z+1}{z-2} = 3i$ si et seulement si $z+1 = 3iz - 6i$ soit encore $z(1-3i) = -1-6i$, ce qui est le cas uniquement pour $z = -\frac{1+6i}{1-3i}$.

Là encore, en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur, on obtient

$$z = -\frac{(1+6i)(1+3i)}{(1-3i)(1+3i)} = -\frac{1+9i+18i^2}{1^2-9i^2} = \frac{17-9i}{10}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 3

Cherchons à chaque fois les solutions sous forme algébrique : $z = a + ib$, avec $a, b \in \mathbf{R}$.

1. On a $2z + 3\bar{z} = 2(a+ib) + 3(a-ib) = 5a - ib$.

Et donc par unicité de la forme algébrique, $z = a + ib$ est solution si et seulement si $5a = 4$ et $-b = -3$. Donc $z = \frac{4}{5} + 3i$ est l'unique solution de l'équation.

2. Sur le même principe, $3z - 2\bar{z} = 3(a+ib) - 2(a-ib) = a + 5ib$, et donc z est solution si et seulement si $a = -5$ et $5b = 1$. Donc $z = -5 + \frac{1}{5}i$ est l'unique solution de l'équation.

Méthode

Pour mettre un quotient sous forme algébrique, on multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

Remarque

La mise sous forme algébrique n'était pas demandée ici, et l'équation est déjà résolue : $\frac{3i}{3+i}$ est un complexe parfaitement défini. Le mettre sous forme algébrique est sûrement plus confortable, mais pas indispensable pour répondre à la question.

Détails

L'unicité signifie que deux complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire.

3. On a $z^2 = (a + ib)^2 = a^2 + 2aib - b^2$ et $z\bar{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$.
 Donc déjà, si z est solution, alors par identification des parties réelles, $a^2 + b^2 = a^2 - b^2$, de sorte que $b^2 = 0$, donc $b = 0$.
 Ainsi, z est réel. Et inversement, pour tout réel a , $a^2 = a\bar{a}$, donc l'ensemble des solutions est l'ensemble des nombres réels.

SOLUTION DE L'EXERCICE 4

C'est un simple calcul, en se rappelant que pour tout nombre complexe z , on a $|z|^2 = z\bar{z}$.
 Il vient donc, pour tous z, z' complexes :

$$\begin{aligned} |z + z'|^2 + |z - z'|^2 &= (z + z')(\overline{z + z'}) + (z - z')(\overline{z - z'}) \\ &= (z + z')(\bar{z} + \bar{z}') + (z - z')(\bar{z} - \bar{z}') \\ &= z\bar{z} + z\bar{z}' + z'\bar{z} + z'\bar{z}' + z\bar{z} - z\bar{z}' - z'\bar{z} - z'\bar{z}' + z\bar{z} + z'\bar{z}' \\ &= 2z\bar{z} + 2z'\bar{z}' \\ &= 2(|z|^2 + |z'|^2). \end{aligned}$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 5

Puisque pour tout $z \in \mathbf{C}^*$, $\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$, on a déjà $|z| = \left|\frac{1}{z}\right|$ si et seulement si $|z| = \frac{1}{|z|}$, soit si et seulement si $|z|^2 = 1$.

Puisque $|z|$ est un réel positif, c'est donc que $|z| = 1$, soit encore $z \in \mathbf{U}$.

À présent, soit $z = a + ib$ un élément de \mathbf{U} écrit sous forme algébrique, donc avec $a, b \in \mathbf{R}$.
 On a alors $|z| = |z + 1|$ si et seulement si¹ $|z|^2 = |z + 1|^2$.
 Or $|z|^2 = a^2 + b^2$ et $|z + 1|^2 = |(a + 1) + ib|^2 = (a + 1)^2 + b^2$.
 Donc $|z|^2 = |z + 1|^2$ si et seulement si

$$a^2 + b^2 = (a + 1)^2 + b^2 \Leftrightarrow a^2 = (a + 1)^2 \Leftrightarrow a^2 = a^2 + 2a + 1 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}.$$

Et alors puisque $z \in \mathbf{U}$, on a $|z|^2 = 1$, donc $a^2 + b^2 = 1 \Leftrightarrow b^2 = 1 - a^2 = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Donc $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ou $b = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ainsi, les seules solutions possibles sont $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $z = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Inversement, si $z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, alors $|z| = 1$ et $|z + 1| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$, si bien que

$$|z| = \left|\frac{1}{z}\right| = |z + 1|.$$

Donc $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est bien solution du problème, et on vérifie de même que $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ est également solution.

Géométriquement : il s'agissait de résoudre le système d'équations $\begin{cases} |z| = \left|\frac{1}{z}\right| \\ |z| = |z + 1| \end{cases}$.

Nous avons déjà dit que la première équation possède pour solution tous les complexes de \mathbf{U} .

Et pour la seconde, notons que $|z| = |z - 0|$ et $|z + 1| = |z - (-1)|$.

Or $|z - 0|$ est la distance entre le point d'affixe z et l'origine et $|z - (-1)|$ est la distance entre le point d'affixe z et le point d'affixe -1 .

Résoudre cette équation, c'est trouver les affixes de tous les points équidistants de O et de $A(-1, 0)$. Autrement dit, c'est trouver les affixes de tous les points de la médiatrice de $[OA]$.

Cette médiatrice est la droite² d'équation $x = -\frac{1}{2}$.

Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble des affixes des points qui sont à la fois sur le

⚠ Attention !

À ce stade, nous n'avons pas pris en compte la seconde équation, donc n'en concluons surtout pas que tous les nombres complexes de \mathbf{U} sont solution, mais seulement que toutes les solutions sont dans \mathbf{U} , certains complexes de module 1 n'étant probablement pas solution (par exemple $z = -1$).

¹ Un module est positif.

² Verticale.

cercle trigonométrique³ et sur la droite d'équation $x = -\frac{1}{2}$.

Mais ces points d'intersection sont au nombre de deux, et ce sont les points de coordonnées

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ et } \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

On retrouve donc bien les images des complexes obtenus précédemment par le calcul.




FIGURE 0.1 – Les deux points d'intersection du cercle trigonométrique et de la médiatrice de $[AO]$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 6

Il s'agit essentiellement de mettre les complexes en question sous forme exponentielle, ce qui nécessite de calculer en premier lieu leur module, puis de trouver⁴ un θ tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$.

$$1. \text{ On a } |z_1| = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{27}{4}} = 3.$$

$$\text{Et alors } \frac{z_1}{|z_1|} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = e^{-i\frac{\pi}{3}}.$$

Donc un argument de z_1 est $-\frac{\pi}{3}$.

$$2. \text{ On a } |z_2| = 7 \text{ et donc } \frac{z_2}{|z_2|} = -i = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Donc $-\frac{\pi}{2}$ est un argument de z_2 .

$$3. \text{ On a } |z_3| = 9 \text{ et}$$

$$\frac{z_3}{|z_3|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = e^{i\frac{5\pi}{6}}.$$

Donc $\frac{5\pi}{6}$ est un argument de z_3 .

$$4. \text{ Variions les plaisirs : plutôt que de calculer le module de } z_4, \text{ notons que } z_4 = 4\sqrt{23}(-1 + i). \text{ Or multiplier un complexe par un réel strictement positif ne change pas ses arguments, donc il s'agit de déterminer un argument de } -1 + i.$$

$$\text{Or } -1 + i = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}.$$

Donc $\frac{3\pi}{4}$ est un argument de $-1 + i$, et donc de z_4 .

SOLUTION DE L'EXERCICE 7

Rappelons la méthode : pour déterminer la forme exponentielle de z , il faut d'abord déterminer $|z|$, puis reconnaître θ tel que $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$.

$$1. \text{ On a } |z_1| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}.$$

Et alors

$$\frac{z_1}{|z_1|} = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = e^{-i\frac{3\pi}{4}}.$$

Donc $z_1 = 3\sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}}$.

³ C'est l'ensemble des points d'affixe dans \mathbb{U} .

⁴ Et pour cela, il vous faudra connaître les valeurs usuelles de \sin et \cos en $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$, et au besoin **utiliser un cercle trigonométrique**.

Remarque

Il s'agit même de ce que nous avons nommé l'argument principal puisqu'il est dans $]-\pi, \pi[$, mais $-\frac{\pi}{3} + 2\pi$ et $-\frac{\pi}{3} + 2022\pi$ sont aussi des arguments de z_1 .

Remarque

On a aussi $\frac{z_1}{|z_1|} = e^{\frac{5i\pi}{4}}$.

$$2. \text{ On a } |z_2| = \sqrt{\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{4}} = 3.$$

Et alors

$$\frac{z_2}{|z_2|} = -\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

Donc $z_2 = 3e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

$$3. \text{ On a évidemment } |z_3| = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ puisque pour un réel, module et valeur absolue coïncident.}$$

Mais $-1 = e^{i\pi}$, donc la forme exponentielle de z_3 est $z_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\pi}$.

$$4. \text{ Allons un peu plus vite, et remarquons que } z_4 = 7\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 7e^{i\frac{\pi}{3}}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 8

$$1. \text{ On a } |j| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1.$$

Donc il existe un $\theta \in \mathbf{R}$ tel que $j = e^{i\theta}$.

Or, on a reconnu que $-\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, si bien que

$$j = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = e^{i\frac{2\pi}{3}}.$$

$$2. \text{ On a donc } j^2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

De même, $j^3 = e^{i3\frac{2\pi}{3}} = e^{2i\pi} = 1$.

$$\text{Et donc } 1 + j + j^2 = 1 - \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.$$

Remarque : cette formule s'inscrit dans un cadre plus général. En effet, la formule que vous avez rencontrée au lycée pour la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \text{ reste valable si } q \in \mathbf{C}.$$

$$\text{En particulier, ici pour } q = j, \text{ on a } 1 + j + j^2 = \frac{1 - j^3}{1 - j}.$$

Or $j^3 = 1$ et donc $1 - j^3 = 0$.

$$3. \text{ Il serait bien entendu possible de procéder par récurrence, mais notons plutôt que par la question 2, } 1 + j = -j^2.$$

Et donc pour tout $n \in \mathbf{N}$, $(1 + j)^{2n+1} = (-j^2)^{2n+1} = (-1)^{2n+1} j^{4n+2} = (-1) \times j^2 \times (j^4)^n$.

Mais $j^3 = 1$, donc $j^4 = j$, si bien que $(j^4)^n = j^n$, et donc $(1 + j)^{2n+1} = -j^{n+2}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 9

$$1. \text{ Il s'agit d'utiliser la formule d'addition pour le cosinus :}$$

$$\cos(2\theta) = \cos(\theta + \theta) = \cos(\theta)\cos(\theta) - \sin(\theta)\sin(\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta).$$

Mais par ailleurs, nous savons que $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$, et donc $\sin^2(\theta) = 1 - \cos^2(\theta)$, si bien que

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - (1 - \cos^2(\theta)) = 2\cos^2(\theta) - 1.$$

Et de même, $\cos^2(\theta) = 1 - \sin^2(\theta)$ si bien que

$$\cos(2\theta) = 1 - \sin^2(\theta) - \sin^2(\theta) = 1 - 2\sin^2(\theta).$$

$$2. \text{ En particulier, en remplaçant } \theta \text{ par } \frac{\theta}{2}, \text{ il vient}$$

$$\cos(\theta) = \cos\left(2\frac{\theta}{2}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) - 1 = 1 - 2\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

$$\text{Et donc } \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \cos(\theta)}{2} \text{ et } \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos(\theta)}{2}.$$

Unicité

Même si nous ne l'avons pas calculé explicitement, l'unicité de la forme exponentielle nous dit alors que $|z_4| = 7$.

Rappel

Pour tous réels a et b ,

$$\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b).$$

3. Puisque $\frac{7\pi}{12} = \frac{1}{2} \frac{7\pi}{6}$, en prenant $\theta = \frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$, on a donc $\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Et donc à l'aide des formules de la question précédente,

$$\cos^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 + \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

Et de même, $\sin^2\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{1 - \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right)}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

Ceci ne suffit pas tout à fait à déterminer les valeurs de $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$ car il y a encore une ambiguïté sur leur signe.

Mais puisque $\frac{\pi}{2} < \frac{7\pi}{12} < \pi$, $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) < 0$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) > 0$.

Et donc il vient

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = -\sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = -\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} \text{ et } \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}.$$

4. Notons $z = (\sqrt{2} - \sqrt{6}) + i(\sqrt{2} + \sqrt{6})$.

On a donc

$$|z|^2 = (\sqrt{2} - \sqrt{6})^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{6})^2 = 2 - 2\sqrt{12} + 6 + 2 + 2\sqrt{12} + 6 = 16.$$

Donc $|z| = 4$. Et alors

$$z = 4 \left(\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} + i \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \right).$$

Le lien avec ce qui précède n'est pas totalement évident, mais notons que

$$\left(\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \right)^2 = \frac{2 - 2\sqrt{12} + 6}{16} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

et que $\left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \right)^2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

Puisque $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$ et $-\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}$ sont tous deux négatifs et de même carré, ils sont égaux.

On prouve de même⁵ que $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$, si bien que

$$z = 4 \left(-\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2} \right) = 4 \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right) = 4e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

Et donc en multipliant le tout par 3,

$$3(\sqrt{2} - \sqrt{6}) + 3i(\sqrt{2} + \sqrt{6}) = 12e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 10

Le plus simple est sûrement de passer par la forme exponentielle, en se rappelant qu'un complexe non nul z est un réel si et seulement si il a pour argument un multiple entier de π .

En effet, si θ est un argument de z , alors

$$z = |z|e^{i\theta} = |z|\cos(\theta) + i|z|\sin(\theta)$$

qui possède une partie imaginaire nulle si et seulement si $\sin(\theta) = 0$, ce qui est le cas si et seulement si θ est un multiple entier de π .

Détails

Placer approximativement $\frac{7\pi}{12}$ sur un cercle trigonométrique pour retrouver ces signes.

⁵ En prouvant qu'ils ont même carré et sont de même signe.

Remarque

Tous les arguments de z différant d'un multiple entier de 2π , si l'un de ces arguments est un multiple entier de π , alors tous les autres aussi.

On a $|\omega| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + 1^2} = 2$. Et donc

$$\omega = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

Et donc pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\omega^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$.

Ainsi, un argument de ω^n est $\frac{n\pi}{6}$.

Il s'agit donc de trouver tous les entiers n pour lesquels $\frac{n\pi}{6}$ est un multiple entier de π .

C'est le cas si et seulement si $\frac{n}{6}$ est un entier, donc si et seulement si 6 divise n .

Soyons un peu plus subtils : si un argument d'un complexe non nul z est un multiple pair de π , c'est-à-dire un multiple de 2π , alors z est un réel **positif**.

En effet, si on note $\theta = 2k\pi$ un tel argument, alors $z = |z|e^{2ik\pi} = |z|e^{i0} = |z| > 0$.

Et si θ est un multiple impair de π , c'est-à-dire s'il existe $k \in \mathbf{N}$ tel que $\theta = (2k+1)\pi$, alors

$$z = |z|e^{2i(k+1)\pi} = |z| \underbrace{e^{i\pi}}_{=-1} \underbrace{e^{2ik\pi}}_{=1} = -|z| < 0.$$

Donc $\omega^n \in \mathbf{R}_+$ si et seulement si $\frac{n}{6}$ est un entier pair, ce qui est le cas si et seulement si n est divisible par 12.

SOLUTION DE L'EXERCICE 11

Il s'agit d'une équation polynomiale de degré 2, dont le discriminant vaut

$$\Delta = 10^2 - 4 \times 169 = -576 = -4 \times 144 = -4 \times 12^2 = -24^2.$$

Donc ses solutions sont $z_1 = \frac{-10 + i\sqrt{-\Delta}}{2} = -5 + 12i$ et $z_2 = \bar{z}_1 = -5 - 12i$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 12

1. Pour $z \neq 0$, on a $z + \frac{1}{z} = 2 \cos(\theta)$ si et seulement si

$$z^2 + 1 = 2z \cos(\theta) \Leftrightarrow z^2 - 2z \cos(\theta) + 1 = 0.$$

Il s'agit d'une équation de degré 2, dont le discriminant vaut

$$\Delta = 4 \cos^2(\theta) - 4 = 4(\cos^2(\theta) - 1) \leq 0.$$

► **Premier cas** : $\theta = 0$.

On a alors $\Delta = 0$, mais l'équation n'est rien d'autre que $z^2 - 2z + 1 = 0$, qui s'écrit encore $(z-1)^2 = 0$, qui possède pour unique solution $z = 1$.

► **Second cas** : $\theta = \pi$.

On a là aussi $\Delta = 0$, mais l'équation s'écrivait cette fois $z^2 + 2z + 1 = 0 \Leftrightarrow (z+1)^2 = 0$, qui possède pour unique solution $z = -1$.

Troisième cas : $\theta \in]0, \pi[$. On a alors $\cos(\theta) \in]0, 1[$, et donc $\Delta < 0$.

Donc l'équation possède deux solutions qui sont

$$z_1 = \frac{2 \cos(\theta) + i\sqrt{4(1 - \cos^2(\theta))}}{2} \text{ et } z_2 = \bar{z}_1.$$

Mais $1 - \cos^2(\theta) = \sin^2(\theta)$, et puisque $\theta \in]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$, si bien que

$$\sqrt{4(1 - \cos^2(\theta))} = \sqrt{4 \sin^2(\theta)} = 2 \sin(\theta).$$

Et donc $z_1 = \cos(\theta) + i \sin(\theta) = e^{i\theta}$ et $z_2 = \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

Remarque : notons que pour $\theta = 0$ et $\theta = \pi$, l'unique solution est encore $e^{i\theta} = e^{-i\theta}$.

2. Nous venons donc de prouver qu'il n'existe qu'au plus deux tels complexes z .

Si $z = e^{i\theta}$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$z^n + \frac{1}{z^n} = e^{in\theta} + \frac{1}{e^{in\theta}} = e^{in\theta} + e^{-in\theta} = 2 \cos(n\theta).$$

Et de même, si $z = e^{-i\theta}$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$z^n + \frac{1}{z^n} = e^{-in\theta} + \frac{1}{e^{-in\theta}} = e^{-in\theta} + e^{in\theta} = 2 \cos(n\theta).$$

Et donc dans tous les cas, si $z + \frac{1}{z} = 2 \cos(\theta)$, alors pour tout $n \in \mathbf{N}$, $z^n + \frac{1}{z^n} = 2 \cos(n\theta)$.

Rappel

Pour une équation à coefficients réels (les seules dont traite le cours), lorsqu'il y a deux solutions complexes non réelles, celles-ci sont conjuguées.

Signe

$\cos^2(\theta) \leq 1$, donc

$$\cos^2(\theta) - 1 \leq 0.$$

Détails

La dernière égalité provient de la formule d'Euler.

SOLUTION DE L'EXERCICE 13

- On a $\alpha_1^2 = (\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}})^2 = re^{2i\frac{\theta}{2}} = re^{i\theta} = \alpha$.
Donc α_1 est bien solution de (E_α) .
- Pour $z \in \mathbb{C}$, on a $z^2 = \alpha$ si et seulement si $z^2 - \alpha = 0$, soit encore $z^2 - \alpha_1^2 = 0$.
Or $z^2 - \alpha_1^2 = (z - \alpha_1)(z + \alpha_1)$, si bien que $z^2 = \alpha$ si et seulement si $(z - \alpha_1)(z + \alpha_1) = 0$.
Puisqu'un produit de complexes est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, on en déduit que $z - \alpha_1 = 0 \Leftrightarrow z = \alpha_1$ ou $z + \alpha_1 = 0 \Leftrightarrow z = -\alpha_1 = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$.
Donc l'équation (E_α) possède exactement deux solutions qui sont α_1 et $-\alpha_1$.
La forme exponentielle de $-\alpha_1$ est alors

$$-\alpha_1 = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} = e^{i\pi}\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} = \sqrt{r}e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)}.$$

- On a $|2 - 2i| = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, et donc

$$2 - 2i = 2\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

On en déduit que les solutions de $z^2 = 2 - 2i$ sont $z = \sqrt{2\sqrt{2}}e^{-i\frac{\pi}{8}}$ et $z = -\sqrt{2\sqrt{2}}e^{-i\frac{\pi}{8}}$.

De même, $\sqrt{3} - i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$ et donc les racines carrées de $\sqrt{3} - i$, c'est-à-dire les solutions de $z^2 = \sqrt{3} - i$ sont $\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$ et $-\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{12}}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 14

- Pour $z \in \mathbb{C}$, on a
 $(z - (3+i))^2 - 8 - 6i = z^2 - 2z(3+i) + (3+i)^2 - 8 - 6i = z^2 - (6+2i)z + 9 + 6i + i^2 - 8 - 6i = z^2 - (6+2i)z$.
- On a donc $z^2 - (6+2i)z + 4 + 2i(3+2\sqrt{3}) = 0$ si et seulement si
 $(z - (3+i))^2 - 8 - 6i + 4 + 2i(2\sqrt{3}+3) = 0 \Leftrightarrow (z - (3+i))^2 - 4 + 4i\sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow (z - (3+i))^2 = 4 - 4i\sqrt{3}$.
- On a $4 - 4i\sqrt{3} = 8\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 8e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Et donc par l'exercice précédent, $(z - (3+i))^2 = 8e^{-i\frac{\pi}{3}}$ si et seulement si $z - (3+i) = \sqrt{8}e^{-i\frac{\pi}{6}}$ ou $z - (3+i) = -\sqrt{8}e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

Donc l'équation (E) possède deux solutions, qui sont

$$z_1 = \sqrt{8}e^{-i\frac{\pi}{6}} + 3 + i \text{ et } z_2 = -\sqrt{8}e^{-i\frac{\pi}{6}} + 3 + i.$$

Reste alors à mettre ces solutions sous forme algébrique, en se rappelant que par définition,

$$e^{-i\frac{\pi}{6}} = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}.$$

Et donc les solutions de (E) sont

$$z_1 = 3 + \sqrt{6} + i(1 - \sqrt{2}) \text{ et } z_2 = 3 - \sqrt{6} + i(1 + \sqrt{2}).$$

SOLUTION DE L'EXERCICE 15

Commençons par noter que $z = 0$ est évidemment solution de l'équation.

Pour $z \neq 0$, notons $z = re^{i\theta}$ sa forme exponentielle, donc avec $r > 0$.

On a alors $z^2 = r^2e^{2i\theta}$ et $\bar{z} = re^{-i\theta}$.

Par conséquent, on a $z^2 = \bar{z}$ si et seulement si $r^2e^{2i\theta} = re^{-i\theta}$, soit encore $e^{2i\theta} = re^{-i\theta}$.

Or deux complexes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même module et que leurs arguments sont congrus modulo 2π . Donc $z^2 = \bar{z}$ si et seulement si $r = 1$ et $2\theta \equiv -\theta$ $[2\pi]$.

Cette dernière condition signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $2\theta = -\theta + 2k\pi \Leftrightarrow 3\theta = 2k\pi \Leftrightarrow$

$$\theta = \frac{2k\pi}{3}.$$

Détails

$r_1e^{i\theta_1} = r_2e^{i\theta}$ si et seulement si

$$\begin{cases} r_1 = r_2 \\ \theta_1 \equiv \theta_2 \quad [2\pi] \end{cases}$$

Donc les solutions de l'équation sont 0 et les $e^{i\frac{2k\pi}{3}}$, pour $k \in \mathbf{Z}$.

Remarque : on peut en fait prouver qu'il n'y a que 3 solutions non nulles. En effet, si $k \in \mathbf{Z}$ est divisible par 3, $e^{i\frac{2k\pi}{3}} = 1$, si k est de la forme $3p + 1$, avec $p \in \mathbf{Z}$, alors $e^{i\frac{2k\pi}{3}} = e^{i\frac{2}{3}} e^{2ip\pi} = e^{i\frac{2}{3}}$, et si k est de la forme $3p + 2$, alors $e^{i\frac{2k\pi}{3}} = e^{i\frac{4}{3}} e^{2ip\pi} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

Alternative : on peut également chercher les solutions sous forme algébrique. Si $z = a + ib$, on a alors $z^2 = a^2 + 2iab - b^2$ et $\bar{z} = a - ib$.

Donc l'équation s'écrit encore $a^2 + 2iab - b^2 = a - ib$.

Ainsi, par identification des parties réelles et imaginaires, z est solution si et seulement si

$$\begin{cases} 2ab = -b \\ a^2 - b^2 = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b(2a + 1) = 0 \\ a^2 - b^2 = a \end{cases}.$$

Notons que la première équation est satisfaite si et seulement si⁶ $b = 0$ ou $2a + 1 = 0$.

► Si $b = 0$, alors la seconde équation est $a^2 = a$, ce qui n'est possible que pour $a = 0$ et $a = 1$.

► Si $2a + 1 = 0$, c'est-à-dire si $a = -\frac{1}{2}$, alors la seconde équation est

$$a^2 - b^2 = a \Leftrightarrow \frac{1}{4} - b^2 = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow b^2 = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Donc } b = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ou } b = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Donc l'équation possède 4 solutions, qui sont 0, 1, $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 16

1. On a $z^2 = (a + ib)^2 = a^2 + 2iab + (ib)^2 = a^2 - b^2 + 2iab$.

Donc⁷ $z^2 = \alpha = A + iB$ si et seulement si $\begin{cases} a^2 - b^2 = A \\ 2ab = B \end{cases}$

2. Si $z^2 = \alpha$, alors $|z^2| = |\alpha|$, c'est-à-dire $|z|^2 = |\alpha|$, soit encore $a^2 + b^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$.

3. Ainsi, si $z^2 = \alpha$, on a à la fois $a^2 - b^2 = A$ et $a^2 + b^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$.

En additionnant ces deux égalités, il vient $2a^2 = A + \sqrt{A^2 + B^2} \Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} + A)$.

Et de même, en soustrayant ces deux égalités,

$$2b^2 = \sqrt{A^2 + B^2} - A \Leftrightarrow b^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} - A).$$

4. L'équation $2ab = B$ nous dit que si B est positif, alors ab aussi, donc a et b sont de même signe.

Et si $B < 0$, alors $ab < 0$, donc a et b sont de signes opposés.

5. Pour $\alpha = -1 + i$, on a $A = -1$ et $B = 1$.

Si bien que si $z = a + ib$ est l'une des deux solutions⁸ de $z^2 = \alpha$, alors

$$a^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} + A) = \frac{1}{2}(\sqrt{2} - 1) \text{ et } b^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{2} + 1).$$

Et de plus, puisque $B > 0$, a et b sont de même signe.

Donc soit $a = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{2} - 1}$ et alors $b = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{2} + 1}$, soit $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{2} - 1}$ et alors

$$b = -\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{2} + 1}.$$

Donc les deux racines carrées de $-1 + i$ sont $u = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{\sqrt{2} - 1} + i\sqrt{\sqrt{2} + 1})$ et son opposé $(-u)$.

De même, si $\alpha = -5 - 12i$, alors $A = -5$ et $B = -12$.

Donc si $z = a + ib$ est une racine carrée de α , alors $a^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{A^2 + B^2} + A) = 4$ et $b^2 = 9$.

De plus, B étant négatif, a et b sont de signes opposés.

Donc soit $a = 2$ et alors $b = -3$, soit $a = -2$ et alors $b = 3$.

Donc les deux racines carrées de $-5 - 12i$ sont $-2 + 3i$ et son opposé.

⁶ Un produit de complexes est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

⁷ Deux complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires sont égales.

⁸ Par l'exercice 13, nous savons que l'équation $z^2 = \alpha$ possède deux solutions.

Raisonnement

Nous venons de prouver que si z est une racine carrée de $-1 + i$, alors c'est l'un des deux nombres complexes (u et $-u$) que nous venons d'obtenir.

Mais cela ne garantit pas directement que ces deux complexes sont des racines carrées de $-1 + i$.

► Nous pourrions le vérifier (en calculant leur carré), ou alors remarquer que l'exercice 16 nous garantit qu'il existe exactement deux telles racines carrées. Or nous venons de prouver que ces deux racines ne peuvent être que u et $-u$. Nécessairement, u et $-u$ sont les deux racines carrées de $-1 + i$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 17

1. Nous savons déjà que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. Donc

$$(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b) = (a^2+2ab+b^2)(a+b) = a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$$

2.a. On a, pour tout $x \in \mathbf{R}$, $\cos^4(x) = \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^4 = \frac{1}{16} (e^{ix} + e^{-ix})^4$. Or

$$(e^{ix} + e^{-ix})^2 = e^{2ix} + 2 + e^{-2ix}$$

si bien que

$$\begin{aligned} (e^{ix} + e^{-ix})^4 &= (e^{2ix} + 2 + e^{-2ix})^2 \\ &= e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix} \\ &= (e^{ix} + e^{-i4x}) + 4(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 6 \\ &= 2\cos(4x) + 8\cos(2x) + 6. \end{aligned}$$

$$\text{Et donc } \cos^4(x) = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{1}{8}\cos(4x).$$

2.b. On a

$$\begin{aligned} \cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^3 \\ &= \frac{1}{8} \left((e^{ix})^3 + 3(e^{ix})^2 e^{-ix} + 3e^{ix} (e^{-ix})^3 + (e^{-ix})^3 \right) \\ &= \frac{1}{8} (e^{3ix} + 3e^{ix} + 3e^{-ix} + e^{-3ix}) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{e^{3ix} + e^{-3ix}}{2} + 3\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right) \\ &= \frac{\cos(3x)}{4} + 3\frac{\cos(x)}{4}. \end{aligned}$$

On applique la formule de la question 1.

Et sur le même principe,

$$\begin{aligned} \sin^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^3 \\ &= \frac{1}{-8i} (e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}) \\ &= \frac{-1}{4} \left(\frac{e^{3ix} - e^{-3ix}}{2i} - 3\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \\ &= \frac{-\sin(3x)}{4} + 3\frac{\sin(x)}{4}. \end{aligned}$$

Et donc au final, il vient

$$\cos^3(x) + 2\sin^3(x) = \frac{\cos(3x)}{4} + 3\frac{\cos(x)}{4} - \frac{\sin(3x)}{2} + \frac{3\sin(x)}{2}.$$

2.c. Pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\begin{aligned} \cos^2(x) \sin^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^3 \\ &= \frac{1}{-32i} (e^{ix} + e^{-ix})^2 (e^{ix} - e^{-ix})^2 (e^{ix} - e^{-ix}) \\ &= \frac{-1}{32i} [(e^{ix} + e^{-ix})(e^{ix} - e^{-ix})]^2 (e^{ix} - e^{-ix}) \\ &= \frac{-1}{32i} (e^{2ix} - e^{-2ix})^2 (e^{ix} - e^{-ix}) \\ &= \frac{-1}{32i} (e^{4ix} - 2 + e^{-4ix}) (e^{ix} - e^{-ix}) \end{aligned}$$

Astuce

Le fait de «couper en deux» la puissance 3 va nous permettre de faire apparaître une identité remarquable et alléger un peu le calcul. Mais un développement «brutal» en utilisant la première question est tout aussi valable... s'il ne comporte pas d'erreur de calcul.

$$\begin{aligned}
&= \frac{-1}{32i} \left(e^{5ix} - e^{3ix} - 2e^{ix} + 2e^{-ix} + e^{-3ix} - e^{-5ix} \right) \\
&= \frac{-1}{16} \left(\frac{e^{5ix} - e^{-5ix}}{2i} - \frac{e^{3ix} - e^{-3ix}}{2i} - 2 \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) \\
&= -\frac{\sin(5x)}{16} + \frac{\sin(3x)}{16} + \frac{1}{8} \sin(x).
\end{aligned}$$

3. Les expressions linéarisées obtenues à la question précédente sont bien plus faciles à intégrer que les expressions de départ.

Donc une primitive de $x \mapsto \cos^4(x)$ est $x \mapsto \frac{3}{8}x + \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(4x)}{32}$.

Une primitive de $x \mapsto \cos^3(x) + 2\sin^3(x)$ est $x \mapsto \frac{\sin(3x)}{12} + \frac{3}{4}\sin(x) + \frac{\cos(3x)}{6} - \frac{3\cos(x)}{2}$.

Enfin, une primitive de $x \mapsto \cos^2(x)\sin^3(x)$ est $x \mapsto \frac{\cos(5x)}{80} - \frac{\cos(3x)}{48} - \frac{\cos(x)}{8}$.

SOLUTION DE L'EXERCICE 18

1. Procédons par étapes en mettant déjà numérateur et dénominateur sous forme exponentielle. On a $|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{4} = 2$ et donc $1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

De même, $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Donc $\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}} = \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4})} = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{12}}$.

Et alors pour $n \in \mathbf{N}$,

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i} \right)^n = \sqrt{2}^n e^{in\frac{\pi}{12}}$$

qui est bien sous forme exponentielle.

Et donc $z_1 = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 + i} \right)^n = \sqrt{2}^n \left(\cos\left(n\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(n\frac{\pi}{12}\right) \right)$ en est la forme algébrique.

2. On a $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ et donc $(1 - i)^n = \sqrt{2}^n e^{-in\frac{\pi}{4}}$.
Et donc

$$\begin{aligned}
(1 - i)^n - \sqrt{2}^n &= \sqrt{2}^n \left(e^{-in\frac{\pi}{4}} - 1 \right) = \sqrt{2}^n e^{-in\frac{\pi}{8}} \left(e^{-in\frac{\pi}{8}} - e^{in\frac{\pi}{8}} \right) \\
&= e^{-in\frac{\pi}{8}} 2i \sin\left(\frac{-n\pi}{8}\right).
\end{aligned}$$

Et alors $(1 + i)^n - \sqrt{2}^n = \overline{(1 - i)^n - \sqrt{2}^n} = -2ie^{-i\frac{-n\pi}{8}} \sin\left(\frac{-n\pi}{8}\right)$.

Notons que ce dénominateur est nul si $\sin\left(\frac{-n\pi}{8}\right) = 0$, c'est-à-dire lorsque $\frac{-n\pi}{8}$ est un multiple entier de π , c'est-à-dire lorsque n est divisible par 8.

Pour de tels n , z_2 n'est tout simplement pas défini.

Et sinon,

$$z_2 = \frac{2ie^{-i\frac{-n\pi}{8}} \sin\left(\frac{-n\pi}{8}\right)}{-2ie^{-i\frac{-n\pi}{8}} \sin\left(\frac{-n\pi}{8}\right)} = -e^{i\frac{-n\pi}{4}}.$$

On en déduit que $z_2 = \cos\left(\frac{-n\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{-n\pi}{4}\right)$.

3. On a $1 + \cos(\theta) + i\sin(\theta) = 1 + e^{i\theta}$.
Factorisons alors par $e^{i\frac{\theta}{2}}$, si bien que

$$1 + \cos(\theta) + i\sin(\theta) = e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right) = 2e^{i\frac{\theta}{2}} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Et donc $z_3 = 4^n \cos^{2n}\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{in\frac{\theta}{2}}$.

Puisque $4^n \cos^{2n}\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$, il s'agit bien de la forme exponentielle.

Et alors la forme algébrique de z_3 est

$$z_3 = 4^n \cos^{2n}\left(\frac{\theta}{2}\right) \left(\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) + i\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \right).$$

Rappel

Une primitive de $x \mapsto \sin(kx)$ est $x \mapsto \frac{-\cos(kx)}{k}$
et une primitive de $x \mapsto \cos(kx)$ est $x \mapsto \frac{\sin(kx)}{k}$.

Méthode

La forme exponentielle est particulièrement adaptée aux quotients (et aux produits) : si on connaît les formes exponentielles de a et b , on connaît celle de $\frac{a}{b}$.

Méthode

Pour déterminer la forme exponentielle de $e^{i\theta} \pm 1$, on factorise par $e^{i\frac{\theta}{2}}$ et on utilise les formules d'Euler.

Détails

$\cos^{2n}(\theta/2) = (\cos^2(\theta/2))^n$
qui est positif comme tout carré de nombre réel.

4. On a $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et donc $(1 + i)^n = \sqrt{2}^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$ et donc

$$(1 - i)^n = \overline{(1 + i)^n} = \sqrt{2}^n e^{-i\frac{n\pi}{4}}.$$

Et donc

$$(1 + i)^n - (1 - i)^n = \sqrt{2}^n \left(e^{i\frac{n\pi}{4}} - e^{-i\frac{n\pi}{4}} \right) = \sqrt{2}^n 2i \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

Donc $z_4 = 2\sqrt{2}^n \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$.

Il s'agit directement là de sa forme algébrique.

Si $\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \geq 0$, il s'agit également de sa forme exponentielle : $z_4 = 2\sqrt{2}^n \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) e^{i0}$.

Dans le cas où $\sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) < 0$,

$$z_4 = \underbrace{\left(-2\sqrt{2}^n \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)\right)}_{>0} e^{i\pi}.$$

Remarque : on aurait également pu se souvenir que $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$, ce qui fournit une autre méthode pour prouver que $(1 + i)^n - (1 - i)^n = \sqrt{2}^n 2i \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right)$.

Plus loin

Un cercle trigonométrique peut nous aider à trouver pour quelles valeurs de n le sinus est positif.

Ce sont les n pour lesquels il existe un entier k tel que

$$2k\pi \leq n\frac{\pi}{4} \leq (2k+1)\pi$$

soit encore

$$\frac{k}{2} \leq n \leq \frac{k}{2} + \frac{1}{4}.$$